

ANLEITUNG FÜR 24 STUNDEN-HARNSAMMLUNG

Zu Beginn der Sammelperiode die Blase entleeren und diese erste Menge verwerfen (nicht in das Sammelgefäß geben).

Ab diesem Zeitpunkt wird der gesamte produzierte Harn für 24 Stunden gesammelt und in das Sammelgefäß gegeben. Bitte **unbedingt bis zum Ende** der Sammelperiode sammeln! Nach Beendigung der Sammelperiode das Sammelgefäß im Institut für Labordiagnostik und Mikrobiologie abgeben.

Katecholamine, Vanillinmandelsäure und Homovanillin

Für diese Bestimmungen ist zu beachten:

2 Tage vor der Harnsammlung keine(n) Kaffee, Tee, Bananen, Ananas, Walnüssen und Käse; keine katecholaminhaltigen Medikamente (z.B. Appetitzügler, Hustentropfen Nasentropfen, Bronchodilatoren).

Das Sammelgefäß enthält 10 ml 10% Salzsäure.

Vorsicht: **Ätzend !!!**

Bitte das Gefäß verschlossen halten und für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Hydroxyindolessigsäure

Für diese Bestimmung ist zu beachten:

2 Tage vor der Harnsammlung kein(e) Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen, Pflaumen, Ananas, Walnüsse, Auberginen, Avocados, Kiwis, Melonen, sowie keine den Serotoninspiegel beeinflussende Medikamente (z.B. Paracetamol, Salicylsäure)

Das Sammelgefäß enthält 10 ml Eisessig.

Vorsicht: **Ätzend !!!**

Bitte das Gefäß verschlossen halten und für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Gefäß ausgegeben an.....

Zur Kenntnis genommen

.....
Unterschrift